

Keep the Herd Moving

Cyclospray 2.45% chlortetracycline HCl.
Topical spray for cattle, pigs and sheep.

LAMENESS



It is important to shake the container thoroughly before spraying.



SPRAYS
180°



NO WITHDRAWAL
PERIOD



ACCURATE
SPRAYING



Withdrawal period for meat,
offal and milk: zero days



Sprays upside down



Dries quickly and does not drip



Treat foot infections
every 24 hrs




Dosage for topical administration:

- Spray for approximately 3 seconds until the treatment area is evenly coloured.
- In case of foot infections, this treatment should be repeated after 30 seconds.

Integrated approach to lameness

The etiology of infectious lameness is multi-factorial. Dechra supports an integrated approach where good husbandry, early detection and correct therapy keep your herds moving.



1 Good husbandry

With the transition towards larger farms and Comfort Zone and free stalls, infectious lameness diseases like dermatitis digitalis have propagated as well. Ensuring good husbandry conditions, like comfortable bedding, flooring systems and manure removal are first-line preventive actions.

2 Early detection

Regular claw trimming by a professional helps with detecting any problems early. Internal and external biosecurity is the key to success: Be aware of integrating infected animals into the herd. Suitable cleaning facilities for boots and tools not only keep your animals safe but also keep the workforce happy.

3 Therapy

Correct treatment of infection lameness must include proper claw trimming on a regular interval. Find out which claw trimming intervals meet the individual farm's needs. After proper cleaning and trimming, make sure that the foot is treated with an antibiotic spray according to the product label. A bandage keeps the animal's foot clean and protected after its release.



ACTIVE INGREDIENT: Chlortetracycline hydrochloride, Ph. Eur., 2.45% w/w. Also contains blue colouring to easily see the area treated.

INDICATIONS: For use in cattle, sheep and pigs as an aid in the prevention of infections of superficial traumatic or surgical wounds caused by microorganisms sensitive to chlortetracycline. Recommended as an aid in the treatment of interdigital dermatitis (footrot) in sheep and cattle.

NOTE: Interdigital dermatitis in sheep and digital dermatitis in cattle are multifactorial disease processes for which there are no unique approaches for prevention and treatment. This product is to be used as part of a whole herd management program which may also include environmental management and footbathing.

STORAGE: Store at room temperature (15-30°C). Extremely flammable aerosol. Pressurized container. May burst if heated. Do not expose the container to direct heat or sunlight. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition.

Alison Brodie | Inside Sales Representative | alison.brodie@dechra.com | 519-731-1325

Dechra Veterinary Products Inc.

1 Holiday Avenue, East Tower, Suite 345, Pointe-Claire, Quebec, H9R 5N3, Canada

Tel.: 1-855-332-9334 | Technical Services: technical.ca@dechra.com | www.dechra.ca



Gardez le troupeau en marche

BOITERIE

Cyclospray 2,45% p/p de chlorhydrate de chlortétracycline. Vaporisateur topique pour bovins, ovins et porcins.



Il est important de bien agiter le contenant avant de vaporiser.



RAYON DE
180°



AUCUN DÉLAI
D'ATTENTE



APPLICATION
PRÉCISE



Délai d'attente pour la viande, les abats et le lait : zéro jour



Vaporise à l'envers



Sèche rapidement, sans goutte



Traitez les infections des onglons aux 24 heures seulement




Posologie pour administration topique :

- Vaporisez pendant environ 3 secondes, jusqu'à coloration uniforme de la zone de traitement.
- En cas d'infections des onglons, répéter le traitement après 30 secondes.

Approche intégrée pour la boiterie

L'étiologie de la boiterie infectieuse est multifactorielle. Dechra soutient une approche intégrée, où les bonnes pratiques d'élevage, la détection précoce et un traitement adéquat gardent vos troupeaux en marche.



1 Bonnes pratiques d'élevage

Avec la transition vers de plus grandes étables et la stabulation libre à logettes et zones de confort, les boiteries d'origine infectieuse, comme la dermatite digitale, se propagent plus facilement. La mise en place de conditions d'élevage adéquates, comme l'installation de matelas et de caillebotis et l'élimination du fumier constituent les approches préventives initiales.

2 Détection précoce

Le parage régulier des onglons par un professionnel aide à la détection précoce de tout problème. Les mesures de biosécurité internes et externes sont les clés de la réussite : restez à l'affût pour éviter l'intégration d'animaux infectés dans le troupeau. Des installations de nettoyage appropriées pour les bottes et les outils veilleront à la sécurité de vos animaux et feront le bonheur de votre équipe.

3 Traitement

Le traitement adéquat de la boiterie infectieuse implique un parage compétent et régulier des onglons. Renseignez-vous sur la fréquence convenant aux besoins en parages de chaque exploitation. Une fois les onglons bien nettoyés et taillés, n'oubliez pas de traiter le pied de l'animal à l'aide d'un vaporisateur antibiotique, conformément à l'étiquette du produit. Un bandage assure la propreté et la protection du pied de l'animal ensuite relâché.



INGRÉDIENT ACTIF : Chlorhydrate de chlortétracycline, Ph. Eur., 2,45 % p/p. Contient également un colorant bleu pour visualiser facilement la zone traitée.

INDICATIONS : Pour utilisation chez les bovins, les ovins et les porcs comme aide à la prévention des infections des plaies chirurgicales ou traumatiques superficielles causées par les micro-organismes réagissant à la chlortétracycline. Pour aider au traitement de lésions actives, associées à la dermatite digitale, causées par des organismes sensibles à la chlortétracycline (chez les porcs et les bovins).

REMARQUE : La dermatite interdigitée chez l'ovin et la dermatite digitale chez le bovin sont des affections multifactorielles pour lesquelles il n'existe pas d'approche préventive et thérapeutique unique. Ce produit est destiné à une utilisation dans le cadre d'un programme de gestion du troupeau pouvant comprendre des mesures environnementales et des pédiluves.

ENTREPOSAGE : Conserver à température ambiante (15-30 °C). Aérosol extrêmement inflammable. Contenant sous pression qui risque d'exploser si chauffé. Ne pas exposer directement à la chaleur ou aux rayons du soleil. Garder loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, d'une flamme vive et d'autres sources d'incendie.

Alison Brodie | Représentante des ventes internes | alison.brodie@dechra.com | 519-731-1325

Produits vétérinaires Dechra inc.

1, avenue Holiday, tour Est, bureau 345, Pointe-Claire (Québec) H9R 5N3 Canada

Tél. : 1 855 332-9334 | Services techniques : technical.ca@dechra.com | www.dechra.ca

