ENTERISOL®
solutions entériques

UNE OPTION DE VACCINATION PERMETTANT D'ÉCONOMISER SUR LA MAIN-D'ŒUVRE

L'administration de vaccin à l'aide de gel permet une vaccination plus rapide et plus pratique dans les maternités qu'au moyen d'un gavage oral individuel.



PROTÉGEZ VOS PORCELETS

Lawsonia intracellularis et *Salmonella* sont des agents pathogènes entériques qui posent des problèmes importants pour la santé et les performances de production des porcs. Désormais, grâce à l'administration des vaccins Enterisol[MC] Ileitis FF et Enterisol Salmonella T/C® à l'aide de gel, il est possible de vacciner les porcelets dans les cages de mise-bas, offrant ainsi une option de vaccination plus rapide[1-3].

La nouvelle méthode d'administration de vaccins au moyen de gel avec un pulvérisateur-doseur commercial qui se porte sur le dos a permis **d'administrer le vaccin à 48 portées, soit 576 porcelets, en environ TROIS MINUTES.**

Il s'agit d'une économie de main-d'œuvre considérable par rapport à l'heure estimée ou plus qu'il faudrait pour manipuler individuellement le même nombre de porcelets et leur administrer le vaccin par gavage oral individuel[1].



CONFIANCE TOTALE | Boehringer Ingelheim

ADMINISTRATION SIMPLE : IL VOUS SUFFIT DE MÉLANGER ET DE PULVÉRISER



PRÉPARER
le gel

AJOUTER
le vaccin

VACCINER
en pulvérisant le mélange sur les tapis des cages de mise-bas



Les porcelets ingèrent le gel en 30 MINUTES environ[1]



TABLEAU 1 : GAIN MOYEN QUOTIDIEN (GMQ) DANS UN ÉLEVAGE DE SEVRAGE-FINITION[1]

	Témoins non vaccinés ayant subi le test de provocation à *L. intracellularis*	Enterisol[MC] Ileitis FF (par gel)	Enterisol[MC] Ileitis FF (dans l'eau)
GMQ Du test de provocation à 70 jours jusqu'à la vente à 148 jours d'âge *N* = 540 porcs par groupe, kg/jour	0,83 ± 0,01[b]	0,93 ± 0,01[a]	0,92 ± 0,01[a]

[a,b] Les moyennes accompagnées de lettres en exposant différentes indiquent une variation significative ($p < 0,0001$).

TABLEAU 2 : RÉFORMES ET MORTALITÉS DANS UN ÉLEVAGE DE SEVRAGE-FINITION[1]

	Témoins non vaccinés ayant subi le test de provocation à *L. intracellularis*	Enterisol[MC] Ileitis FF (par gel)	Enterisol[MC] Ileitis FF (dans l'eau)
RÉFORMES ET MORTALTÉS (%) Du test de provocation à 70 jours jusqu'à la vente à 148 jours d'âge *N* = 540 porcs par groupe	7,45 ± 0,92[b]	4,31 ± 0,95[a]	4,11 ± 0,95[a]

[a,b] Les moyennes accompagnées de lettres en exposant différentes indiquent une variation significative ($p < 0,007$).

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant de Boehringer Ingelheim ou visitez le site **SWINEINFO.CA/FR**

CONFIANCE TOTALE | Boehringer Ingelheim

PROCURE UNE PROTECTION ÉPROUVÉE

Comparée à d'autres modes d'administration de vaccins par voie orale, **l'administration à l'aide de gel confère le même niveau de protection** contre *Lawsonia* et *Salmonella*[1-2].

UN NOM AUQUEL VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE

Choisissez Enterisol[MC] Ileitis : un vaccin qui a fait ses preuves depuis 20 ans et qui permet de soutenir la santé intestinale et d'améliorer les performances de production des porcs[3-4].

Discutez avec votre médecin vétérinaire ou un représentant de Boehringer Ingelheim pour en savoir plus sur Enterisol[MC].

ENTERISOL®
solutions entériques

[1] Nerem J. *et al.* Evaluation of the Oral Administration of *Lawsonia intracellularis* Vaccine by Gel. In Proceedings of AD Leman Swine Conference, 2023, Poster number 71.

[2] Données en dossier.

[3] Leite F. *et al.* Enterisol[MC] Ileitis– Ce que nous avons appris après 20 ans de lutte contre *Lawsonia intracellularis* Accessible sur : https://www.boehringer-ingelheim.com/ca/fr/sante-animale/enterisol-ileitis%E2%80%93ce-que-nous-avons-appris-apre-20-ans-de-lutte-contre-lawsonia-intracellularis. Consulté le 22 février 2023.

[4] Kolb J. *et al.* Summary of field trials implementing Enterisol[MC] Ileitis against ileitis. In proceedings of the 33rd Annual AASV Meeting, 2003;243-244.

Le logo d'Enterisol et Enterisol Salmonella T/C® sont des marques déposées de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisées sous licence. Enterisol[MC] est une marque de commerce de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence. © 2023 Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc. Tous droits réservés. CA-POR-0064-2023